Аминоприм
200 ml

АМИНОКИСЛОТЫ 5%
И СОРБИТОЛ 5%

Прозрачный бесцветный раствор для инфузий, содержащий хорошо сбалансированную смесь чистых кристаллических, незаменимых, полунезаменимых и заменимых аминокислот в оптимальных концентрациях для синтеза белка

Поддержка в период невозможности питания через ЖКТ.


Аминокислоты - строительный материал для белков.

Контролируемое и точное дозирование.

Поддержка белкового обмена.

Быстрое и полное усвоение.

Комплексный эффект.



AKIS
PHARMA

АМИНОПРИМ высоко ценится как добавка для парентерального питания при следующих состояниях:

- Острая и хроническая почечная недостаточность при гемофильтрации, перитонеальном диализе и гемодиализе.
- Для компенсации потерь аминокислот во время и после диализа или гемофильтрации.
- Почечная недостаточность после политравмы, обширного хирургического вмешательства и сепсиса.
- Дополнение к низкобелковой диете пациентам с хронической почечной недостаточностью.

Аминоприм
200 ml

АМИНОКИСЛОТЫ 5%
И СОРБИТОЛ 5%

Инфузия может осуществляться периферическим или центральным путем, соответствующим образом регулируя скорость потока.

Состав:

Каждые 100 мл содержит

Состав	Аминокислоты (5% з/в) и сорбитол (5% в/в)
L-изолейцин USP	0,352 г
L-лейцин USP	0,490 г
L-лизин гидрохлорид USP	0,430 г
L-метионин USP	0,225 г
L-фенилаланин USP	0,533 г
L-треонин USP	0,250 г
L-триптофан USP	0,090 г
i-валин USP	0,360 г
L-аргинина гидрохлорид USP	0,500 г
L-гистидина гидрохлорид H,0 BP	0,250 г
Глицин БП	0,760 г
L-аланин USP	0,200 г
L-пролин USP	0,100 г
L-серин USP	0,100 г
L-цистеин BP	0,010 г
L-тирозин USP	0,025 г
L-аспарагиновая кислота	0,250 г
L-глутаминовая кислота	0,075 г
Сорбитол БП	5.000 г
Вода для инъекций Б.П.	Q.S.
Электролиты (Ммоль/л)	
Na+	37.000 (Ммоль/л)
Cl-	59.000 (Ммоль/л)
Всего аминокислот	50 Гр/л
Общее содержание азота	7.25 Гр/л
Энергетическое содержание	400 Ккал/л
Осмолярность	800 Мосмол/п

ПОКАЗАНИЯ:

АМИНОПРИМ высоко ценится как добавка для парентерального питания при следующих состояниях:

- Острая и хроническая почечная недостаточность при гемофильтрации, перитонеальном диализе и гемодиализе.
- Для компенсации потерь аминокислот во время и после диализа или гемофильтрации. Почечная недостаточность после политравмы, обширного хирургического вмешательства и сепсиса.
- Дополнение к низкобелковой диете пациентам с хронической почечной недостаточностью.

ДОЗИРОВКА:

Рекомендуемая суточная доза: до 0,5 г аминокислот / кг массы тела в день для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью, не получающих диализ. До 1 г аминокислоты / кг массы тела / день у пациента, получающего лечение гемодиализом, гемофильтацией или перитонеальным диализом. Дозировка должна быть скорректирована в соответствии с потребностями в аминокислотах в зависимости от возраста, массы тела и состояния пациентов.

Достаточное количество калорий следует вводить одновременно перорально или парентерально.

СКОРОСТЬ ИНФУЗИИ:

Скорость инфузии АМИНОПРИМ не должна превышать 40 капель в минуту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АМИНОПРИМ доступен в виде стерильного апирогенного контейнера для одной дозы, который можно вводить через периферические вены или центральным венозным путем с использованием апирогенного внутривенного введения, набором для введения с асептической техникой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в прохладном, защищенном от света месте. Не замораживать.

УПАКОВКА:

АМИНОПРИМ выпускается в стеклянных бутылках по 200 и 500 мл.