Аминоприм

АМИНОКИСЛОТЫ 5% И СОРБИТОЛ 5%

Описание:
АМИНОПРИМ - это прозрачный бесцветный раствор для инфузионный, содержащий хорошо сбалансированную смесь чистых кристаллических, незаменимых, полузаменимых и заменимых аминокислот в оптимальных концентрациях для синтеза белка.
Инфузия может осуществляться периферическим или центральным путем, соответствующим образом регулируя скорость потока.

Состав:
Каждые 100 мл содержит

Состав	Аминокислоты (5% в/в) и сорбитол (5% в/в)
L-изолейцин USP	0,352 г
L-лейцин USP	0,490 г
L-лизин гидрохлорид USP	0,430 г
L-метионин USP	0,225 г
L-фенилаланин USP	0,533 г
L-треонин USP	0,250 г
L-триптофан USP	0,090 г
L-валин USP	0,360 г
L-аргинина гидрохлорид USP	0,500 г
L-гистидина гидрохлорид H_20 BP	0,250 г
Глицин БП	0,760 г
L-аланин USP	0,200 г
L-пролин USP	0,100 г
L-серин USP	0,100 г
L-цистеин BP	0,010 г
L-тирозин USP	0,025 г
L-аспарагиновая кислота	0,250 г
L-глутаминовая кислота	0,075 г
Сорбитол БП	5,000 г
Вода для инъекций Б.П.	Q.S.

Электролиты (Ммоль/л)	
Na+	37.000 (Ммоль/л)
Cl-	59.000 (Ммоль/л)
Всего аминокислот	50 Гр/л
Общее содержание азота	7.25 Гр/л
Энергетиче скоесодержание	400 Ккал/л
Осмолярность	800 Мосмол/л

ПОКАЗАНИЯ:
АМИНОПРИМ высоко ценится как добавка для парентерального питания при следующих состояниях:
Острая и хроническая почечная недостаточность при гемофильтрации, перитонеальном и гемодиализе.
Для компенсации потерь аминокислот во время и после диализа или гемофильтерации. Почечная недостаточность после политравмы, обширного хирургического вмешательства и сепсиса.
Дополнение к низкобелковой диете пациентам с хронической почечной недостаточностью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Нарушения обмена аминокислот;
Печеночная кома;
Серьезные нарушения функции почек, гипернатриемия и гиперкалиемия;
Гипергидратация;
Метаболический ацидоз
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Если раствор вводится слишком быстро, могут развиться признаки непереносимости и увеличения почечных потерь, сопровождаемых дисбалансом аминокислот. Необходимо контролировать баланс жидкости, электролиты сыворотки, уровень сахара в крови и кислотно-щелочной баланс.
При длительной терапии следует включать жир в режим питания, чтобы избежать дефицита незаменимых жирных кислот.
Раствор не подходит для длительного парентерального применения, поскольку он не содержит достаточного количества заменимых аминокислот. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
Иногда неприятные ощущения в груди и сердцебиение.
При превышении рекомендованной скорости инфузии могут возникнуть тошнота, рвота, озноб и жар.
ДОЗИРОВКА:
Рекомендуемая суточная доза: до 0,5 г аминокислот / кг массы тела в день для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью, не получающих диализ. До 1 г аминокислоты / кг массы тела / день у пациента, получающего лечение гемодиализом, гемофильтацией или перитонеальным диализом. Дозировка должна быть скорректирована в соответствии с потребностями в аминокислотах в зависимости от возраста, массы тела и состояния пациентов.
Достаточное количество калорий следует вводить одновременно перорально или парентерально.
СКОРОСТЬ ИНФУЗИИ:
Скорость инфузии АМИНОПРИМ не должна превышать 40 капель в минуту.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
АМИНОПРИМ доступен в виде стерильного апирогенного контейнера для одной дозы, который можно вводить через периферические вены или центральным венозным путем с использованием апирогенного внутривенного введения, набором для введения с асептической техникой.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в прохладном, защищенном от света месте. Не замораживать.
УПАКОВКА:
АМИНОПРИМ выпускается в стеклянных бутылках по 200 и 500 мл.

Manufactured for / Произведено для :
Akis Pharma
Тбилиси, Грузия

Exported By/Экспортировано кем:
Salvavidas
Committed for a better life
САЛВАВИДАС ФАРМАЦЕВТИКАЛ ПВТ. ЛТД.
г. Сурат, обл. Гужарат, Индия
www.salvavidaspharma.com
® Зарегистрированный товарный знак

Manufactured by / Производитель :
Shree Krishnakeshav Laboratories Ltd.
Nr. Yogeshwar Estate, B/H. Torrent Power ltd,
Amraiwadi Road, Ahmedabad-380 008,
Gujarat State, India.

ELL-564022-01

8906102886820