
10 СУППОЗИТОРИЕВ

АНДРОПРОСТ ПЛЮС

Экстракт простаты Ломефлосацин

- Острый и хронический бактериальный простатит
- Инфекционно-воспалительный заболевания, вызванные чувствительными к ломефлоксацину микроорганизмам

Средство для лечения хронического простатита



Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства АНДРОПРОСТ ПЛЮС

Торговое название препарата: Андропрост Плюс.
Международное непатентованное название: ломефлоксацин+простаты экстракт
Лекарственная форма: суппозитории ректальные
Состав: один суппозиторий содержит: активные вещества:
простаты экстракт - 100 мг (в пересчете на водорастворимые пептиды - 20 мг), ломефлоксацина гидрохлорид - 400 мг;
вспомогательные вещества: основа для суппозиториев - жир твердый (витепсол) - достаточное количество до получения суппозитория массой 2,0 г.
Фармакотерапевтическая группа: Противомикробное средство, фторхинолон
Фармакологическое действие: Комбинированный препарат Андропрост Плюс обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами. Ломефлоксацин - бактерицидное средство широкого спектра действия из группы фторхинолонов. Воздействует на бактериальный фермент ДНК-гиразу, обеспечивающую сверхспирализацию, образует комплекс с её тетрамером (субъединицы гиразы A2B2) и нарушает транскрипцию и репликацию ДНК, приводит к гибели микробной клетки.
Высоко активен в отношении грамотрицательных аэробных микроорганизмов:
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitides, Escherichia coli, Citrobacter diversus, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus vulgaris, Salmonella spp., Shigella spp., Moraxella morganii, Haemophilus influenzae e parainfluenzae, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa.
Умеренно чувствительны к препарату Staphylococcus aureus, Staphylococcus Epidermidis, Serratia liquifaciens, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia trachomatis, Hafnia alvei, Citrobacter freundii, Aeromonas hydrophila, Proteus mirabilis, Proteus stuartii, Providencia rettgeri, Providencia alcalifaciens, Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozaenae, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans.
Устойчивы к препарату Streptococcus spp., Pseudomonas cepacia, Ureaplasma urealyticum, Treponema pallidum, Mycoplasma hominis и анаэробные бактерии.
На большинство микроорганизмов действует в низких концентрациях (концентрация, необходимая для подавления роста 90% штаммов, обычно не более 1 мкг/мл). Резистентность развивается редко. Простаты экстракт обладает органотропным действием на простату. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Уменьшает тромбообразование, обладает антиагрегантной активностью, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе. Нормализует параметры простаты и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, улучшает копулятивную функцию.
Показания к применению: Острый и хронический бактериальный простатит, вызванный чувствительными микроорганизмами, в том числе сопровождающийся воспалительными заболеваниями мочеполового тракта. Состояния до и после оперативного вмешательства на предстательной железе.
Противопоказания:
- Гиперчувствительность к компонентам препарата.
- Возраст до 18 лет (период формирования и роста скелета).
- С осторожностью Церебральный атеросклероз, эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы с эпилептическим синдромом.

Способ применения и дозы: Ректально, по 1 суппозиторию 1 раз в день после клизмы или самостоятельного опорожнения кишечника. Перед применением суппозиторий следует извлечь из контурной ячейковой упаковки. После введения препарата Андропрост Плюс желательно в течение 30-40 минут находиться в постели. Курс лечения продолжается до исчезновения возбудителя в секрете простаты и составляет от 10 до 30 дней (продолжительность лечения определяется врачом индивидуально для каждого пациента).
Побочные действия:
Побочные действия препарата Андпрост Плюс за исключением аллергических реакций, связаны с наличием в его составе антибиотика ломефлоксацин.
Аллергические реакции: кожный зуд, крапивница, фотосенсибилизация, злокачественная экссудативная эритема (синдром Стивенса-Джонсона).
Со стороны нервной системы: астения, головокружение, нервозность, тревожность, утомляемость, недомогание, головная боль.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Форма выпуска: Суппозитории ректальные 400 мг+20 мг. 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке, две контурные ячейковые упаковки вместе с рекомендацией по применению помещаются в картонную пачку.
Срок годности: 2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.