ЦИТИКОМЕД

ЦИТИКОЛИН

1000 мг/4 мл

Восстанавливает целостность нейронов, поврежденных ишимией

Сокращает объем поврежденных тканей во время острого периода ишемии

Особая нейропротекция в решающие минуты



- Цитикомед представляет собой предшественника основных ультраструктурных компонентов клеточной мембраны;
- Содействует восстановлению поврежденной мембраны нейрона и ее защите от ишемии;
- Содействует ингибированию фосфолипазы и препятствует повреждению мембранных систем;
- Препятствует возникновению свободных радикалов в избыточном количестве;
- Воздействует на механизмы апоптоза;
- Препятствует смерти клетки;
- Улучшает развитие симптомов, имеющихся во время гипоксии: ухудшение памяти, эмоциональная лабильность, безинициативность, сложности во время выполнения ежедневной деятельности и самообслуживания;
- Не действует на дыхание;
- Возможно длительное применение

AKIS
PHARMA

Путь к здоровью нации!

Показания:

- Острый период ишемического инсульта
- Восстановительный период после ишемического и геморрагического инсульта
- Черепно-мозговая травма, острый и восстановительный период
- Вызванные дегенеративными и сосудистыми заболеваниями когнитивные, сенситивные и двигательные расстройства, в том числе, болезни Паркинсона и Альцгеймера

Состав:

1 мл препарата содержит: цитиколин (в виде цитиколина натрия) - 250 мг,
Вспомогательные вещества: **метилпарабен, пропилпарабен, метабисульфит натрия, динатрия эдетат, вода для инъекций.**

Порядок применения и дозирование:

Препарат предназначен для внутривенного и внутримышечного введения. Дозирование и продолжительность лечения зависят от тяжести поражения мозга и определяются лечащим врачом.

Острый период ишемического инсульта: 1000 мг каждые 12 часов, с момента установления диагноза, в виде медленной внутривенной инъекции (3-4 минуты) или посредством капельницы (40-60 капель в минуту) через 3-7 дней можно перейти на внутримышечную инъекцию (1-2 инъекции в сутки).

Ишемический и геморрагический инсульт, восстановительный период после черепно-мозговой травмы, вызванные дегенеративными и сосудистыми заболеваниями мозга когнитивные расстройства: 500-2000 мг в сутки, в мышцу или вену.

Нарушения сознания, вызванные травмами головы или хирургическим вмешательством в головной мозг: 500-1000 мг 1-2 раза в день внутнивенно или внутримышечно.

Острые или повторные внутричерепные кровоизлияния: внутривенно, медленно (30 капель в минуту), дневная доза не должна превышать 1000 мг.

Вызванная внутричерепными кровоизлияниями гемиплегия: 1000 мг 1 раз в день внутривенно, в течение 4 недель.

Паркинсонизм: 500 мг 1 раз в день внутривенно, в течении 3-4 недель.