# Фенолайф

6 вагинальных суппозиториев

Метронидазол, Нистатин, Неомицин,
Дексаметазон и Лидокаин




Отпускается по рецепту врача

# Фенолайф

Метронидазол, Нистатин, Неомицин,
Дексаметазон и Лидокаин

6 вагинальных суппозиториев

Fenolife

AKIS
PHARMA

Путь к здоровью нации!

Инструкция по применению лекарственного препарата

# Фенолайф

6 вагинальных суппозиториев

Метронидазол, Нистатин, Неомицин, Дексаметазон и Лидокаин

**Лекарственная форма:** вагинальные свечи

AKIS PHARMA

Путь к здоровью наших!

**Состав:**

Каждая суппозитория содержит:

| | |
|---|---|
| Метронидазол BP | 500мг |
| Нистатин BP | 100.000 МЕ |
| Неомицин Сульфат BP | 5мг |
| Дексаметазон BP | 0.2 мг |

Лидокаин BP 10мг

Основа для суппозиториев q.s.

**ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:**

Противогрибковое: трихоцидное;
антибактериальное и противовоспалительное локальное действие.

**ПОКАЗАНИЯ:**

Местное лечение вульвита, вагинита и цервикальных инфекций в тех случаях, когда нет определенного этиологического диагноза.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:**

Антибактериальный спектр действия
Метронидазол: trichomonas vaginalis,
Анаэробные грамотрицательные бациллы, включая: Bacteroides fragilis, Fusobacterium spp. Анаэробные грамположительные бациллы: Clostridium rium. Грамположительные кокки,
включая: Peptococcus niger, Peptoestreptococcus spp Нистатин: Candida albicans non-albicans. Неомицин: Escherichia coli Klebsiella spp-Enterobacter

**ФАРМАКОДИНАМИКА:**

**Метронидазол.** Антибактериальное, противопротозойное средство; активно против большинства облигатных бактерий и протозоа, путем прохождения
внутриклеточного химического восстановления через механизмы, уникальные для анаэробного метаболизма. Восстановленный метронидазол, который цитотоксичный, но имеет короткий период полувыведения, взаимодействует с ДНК чтобы вызвать нарушение спиральной структуры, разрыв цепи, как следствие ингибирование синтеза нуклеиновой кислоты и гибель клетки. Метронидазол обладает бактерицидным действием. Его использование не изменяет естественную симбиотическую флору

**Нистатин Сульфат** противогрибковое средство с фунгистатическим и фунгицидным действием. Он привязывается к стеринам в клеточной мембране, действующим как селективный барьер, приводит к потере важнейших составляющих клетки.

**Неомицин Сульфат** это антибиотик с локальным антисептическим действием.

**Лидокаин.** Это анестетик для слизистой оболочки влагалища.

**Дексаметазон.** Локальное применение дексаметазона оказывает противовоспалительное, противозудное и сосудосуживающее действие. Его механизм действия полностью не известен.
Имеющиеся данные предполагают взаимосвязь между их сосудосуживающим действием и терапевтической эффективностью у людей.

**ФАРМАКОКИНЕТИКА:**

Когда метронидазол применяют вагинально, системная абсорбция приблизительно составляет 20% от дозы.
Неомицин Сульфат и Нистатин Сульфат не абсорбируются цельными кожными покровами или слизистой оболочкой. Однако, неомицин может быть абсорбирован при этом способе применения, если имеются крупные повреждения, ожоги или грануляционные участки, таким образом, вероятность системных эффектов неомицина Сульфат не исключена.
Дексаметазон: хотя количество кортикостероида низкое, не исключен системный эффект у чувствительных, пациентов. После абсорбции, он имеет такую же фармакокинетику как * кортикостероиды, которые назначали системно. Он привязывается к протеинам плазмы и преимущественно метаболизируется печенью и затем выводится почками. Некоторые кортикостероиды для наружного применения и их метаболиты также выводятся в желчь.

**ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Взрослые: введите 1 или 2 суппозитория во влагалище, 1 раз в день в течение 6 до 12 дней. Если необходимо повторить лечение, рекомендуется 4-6 недельный интервал.