

ИНОТЕКС

Теноксикам 20 мг

- *Быстрое обезболивание*
- *Продолжительное действие*
- *Удобство при невозможности приема внутрь*
- *Мощное противовоспалительное действие*
- *Меньшая нагрузка на желудочно-кишечный тракт*





AKIS PHARMA

Путь к здоровью пациента!

ИНОТЕКС Теноксикам 20 мг

Состав:
1 флакон содержит:
активное вещество: теноксикам - 20 мг;
вспомогательные вещества: маннитол 57,33 мг, гидроксид натрия 3,28 мг, трометамин 3,00 мг, метабисульфит натрия 2,00 мт, динатрия эдетат 0,20 мг, кислота соляная - q.s.
1 ампула растворителя содержит: вода для инъекций - 2,0 мл.
Описание: лиофилизированный порошок от желтого до зеленовато-желтого цвета
Фармакотерапевтическая группа: нестероидные противовоспалительные средства
Фармакологические свойства
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Относится к классу оксикамов. Оказывает выраженное и длительное анальгезирующее, противовоспалительное, а также жаропонижающее действие.
Механизм действия связан с ингибированием фермента циклооксигеназы (угнетает активность ЦОГ-1 и ЦОГ-2), что приводит к нарушению метаболизма арахидоновой кислоты и блокаде синтеза простагландинов в очаге воспаления, а также прочих тканях организма. Кроме того, Теноксикам уменьшает накопление лейкоцитов в очаге воспаления. При ревматических заболеваниях ослабляет боль в суставах в покое и при движении, уменьшает утреннюю скованность и отечность.
Фармакокинетика
Всасывание и распределение
Быстро и полностью всасывается в ЖКТ. Биодоступность - 100%. Стах достигается через 2 ч. Связывается с белками плазмы на 99%. Vd - 0,15 л/кг.
Метаболизм и выведение
Гидроксилируется в печени. Легко проходит через гистогематические барьеры. Т,- 60-75 ч. Основная часть выводится в виде неактивных метаболитов с мочой, остальная - с желчью.
Показания к применению
Симптоматическое лечение следующих воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата:
- остеоартроз;
- ревматоидный артрит;
- анкилозирующий спондилоартрит;
- болевой синдром: тендинит, бурсит, радикулит, полиартрит;
- купирование боли при остром подагрическом артрите.

Способ применения и дозы
Инъекции вводятся внутримышечно и внутривенно.
Лиофилизат следует растворить в 2 мл предоставленного растворителя (2 мл стерильная вода для инъекций). Это восстановленный раствор должен быть использован немедленно.